

CHGORINGER PAYS DES COLLINES

BRONCHOSCOPIE

PNEUMOLOGIE

Dr. Alexander Dr. Gysbrechts Dr. Hill

SECRÉTARIAT MÉDECINE INTERNE Tél. 055/23 36 68

absl Werken Glorieux I ch Glorieux Avenue Glorieux 55, B-9600 Ronse T 055 23 30 11, F 055 23 30 22 www.azglorieux.be, info@azglorieux.be

> 11/04/2017 INW01 FR

BUT DE L'EXAMEN

Cet examen permet de voir les bronches à l'aide d'un tube (endoscope) introduit par le nez ou la bouche. Lors de l'examen, des prélèvements (biopsies) peuvent être obtenus pour préciser les anomalies vues. Des sécrétions peuvent être aspirées pour analyses.

PRÉPARATION

Pour que l'examen se déroule dans de bonnes conditions, il faut être à jeun. Il ne faut donc ni boire ni manger au moins 6 heures avant l'examen. Informez le médecin de vos allergies et de vos médicaments. Signalez toute maladie grave (diabète avec insuline, maladie cardiaque ou pulmonaire et tout médicament, surtout des médicaments destinés à rendre le sang plus fluide: Marcoumar, Marevan, Sintrom, aspirine, Plavix Ticlid) qui pourraient nécessiter des précautions particulières. Avant l'examen, il faut enlever les fausses dents.

DÉROULEMENT DE L'EXAMEN

L'examen, d'une durée en général d'environ 15 minutes, n'est pas douloureux mais souvent désagréable. Cet inconfort (surtout la toux) est diminué par une anesthésie locale et par l'éventuelle injection intraveineuse d'un calmant (optionnel). L'anesthésie locale peut faussement vous donner l'impression que la muqueuse de la gorge gonfle. Pendant l'examen, vous êtes assis et l'endoscope est introduit par la bouche ou une narine.

L'endoscope est avancé jusqu'aux cordes vocales qui sont alors anesthésiées séparément avant que l'endoscope n'atteigne les bronches mêmes. Cette anesthésie peut entraîner une quinte de toux passagère. Des prélèvements de muqueuse sont souvent pratiqués, les pinces nécessaires étant introduites à l'intérieur de l'endoscope.

APRÈS L'EXAMEN

La gorge reste anesthésiée deux heures après l'examen afin d'éviter une fausse déglutition avec des conséquences graves.

Il est interdit de boire ou de manger deux heures après l'examen.

ATTENTION

Si vous avez reçu un calmant, la conduite d'un véhicule ou tout acte dangereux est interdit le jour de l'examen. Les calmants peuvent affecter vos réflexes ou votre jugement durant le reste de la journée.

PRÉCAUTIONS ET RISQUES

La bronchoscopie est un examen à risques minimes. Cependant, aucun médecin ne peut garantir le succès ou l'absence de risques liés à son intervention. Un maximum de précautions sont prises pour minimiser les inconvénients et les risques. Par exemple, l'endoscope et le matériel accessoire utilisés sont stériles ou désinfectés pour minimiser tout risque. Une gêne persistante au niveau de la gorge ou une irritation prolongée de la veine utilisée pour l'injection sont possibles. Les complications majeures sont l'hémorragie, le pneumothorax (dégonflement du poumon), les troubles du rythme cardiaque, la chute de tension, le manque d'oxygène. Elles sont toutes très rares. Par mesure de précaution, le taux d'oxygène et le rythme cardiaque sont mesurés pendant l'examen.

EN CAS DE REFUS

Si l'examen que votre médecin a proposé n'est pas réalisé, cela peut influencé le diagnostic de la maladie et avoir des conséquences néfastes.

POUR TERMINER

Si, après la lecture de ce folder, vous avez encore des questions, posez les quand vous arrivez au service avant votre examen. Le médecin est à votre disposition pour toute information complémentaire.

	RENDEZ-VOUS	
Date:		
Heure:		
Service:		

Si, en raison de circonstances imprévues, l'examen ne peut se dérouler, prière d'avertir le service le plus rapidement possible.

Contactez le Secrétariat Médecine Interne: 055/23 36 68

