



CATHÉTER À CHAMBRE IMPLANTABLE

SERVICE CLINIQUE DE JOUR
055/23 33 05

QUEL EST LE PRINCIPE DU CATHETER A CHAMBRE IMPLANTABLE?

Le cathéter à chambre implantable, encore appelé PAC ou Porth-a-cath®, est un système constitué d'un boîtier implanté directement sous la peau relié à un cathéter.

Ce système est intéressant pour les personnes qui ont un accès veineux périphérique limité et chez celles qui ont un traitement qui le nécessite.


Ce dispositif va permettre de faciliter les perfusions, transfusions, prélèvements sanguins ainsi que l'administration de médicaments comme la chimiothérapie. Un fin tuyau est introduit dans une veine du cou ou du bras et arrive jusqu'à une grosse veine à l'entrée du cœur.

LE FONCTIONNEMENT DU CATHETER A CHAMBRE IMPLANTABLE

Après une soigneuse désinfection avec un antiseptique, l'infirmière procédera à la mise en place de l'aiguille spéciale en piquant à travers la peau au niveau de la membrane souple du boîtier.

Vous ressentirez une brève douleur comme lors d'une prise de sang. Cette douleur peut être supprimée en posant un patch ou une crème d'anesthésique local appliqués une heure avant la pose de la perfusion.

L'aiguille peut rester en place jusqu'à 7 jours. Le Port-a-cath® peut rester implanté aussi longtemps que votre médecin pense que vous en avez besoin.



COMMENT VOUS PREPARER A LA POSE DU CATHETER A CHAMBRE IMPLANTABLE ?

La pose d'un cathéter nécessite une brève intervention chirurgicale sous anesthésie générale ou locale. Pour l'anesthésie générale, il sera nécessaire d'être à jeun avant l'intervention.

Le cathéter est mis en place par un chirurgien en salle d'opération. En fin d'intervention, le bon fonctionnement du cathéter est vérifié et son bon positionnement sera éventuellement confirmé par une radiographie du thorax. Le dispositif est immédiatement fonctionnel et permet de commencer le traitement.

Les fils placés au niveau de l'incision seront enlevés au bout de 10 jours.

Un PAC ne nécessite pas de soins particuliers. Le boîtier par lequel les produits sont injectés étant sous la peau, il ne faut pas de pansement, sauf immédiatement après avoir été posé et ce le temps de la cicatrisation.

La pose du Port-a-cath® ne demande qu'un jour d'hospitalisation. Il est déconseillé de rouler en voiture le jour de l'intervention.

Les premiers jours après l'opération, évitez les gestes trop brusques avec le bras (côté du PAC) afin de permettre au Port-a-cath® de s'adhérer à la paroi musculaire.

QUELS SONT LES RISQUES EVENTUELS DE COMPLICATIONS IMMEDIATES ?

Après la pose du PAC, un hématome et quelques douleurs locales sont possibles.

Les douleurs disparaissent en quelques heures ou quelques jours. Votre médecin peut vous donner des médicaments pour vous soulager.

QUELS SONT LES SIGNES QUI DOIVENT VOUS ALERTER ?

En dehors de la période post-opératoire immédiate, une chambre à cathéter implantable doit rester indolore. Il est donc nécessaire de contacter l'équipe médicale qui vous a pris en charge dès que des sensations décrites ci-après apparaissent :

- Sensation de fièvre
- Frissons
- Douleurs
- Gonflement
- Rougeurs

Dans tous les cas, un traitement adapté vous sera proposé.

LE PORT DU SYSTEME VA-T-IL CHANGER VOTRE MODE DE VIE ?

Le PAC permet de se doucher, de se baigner, faire du sport, voyager sans problème, d'utiliser la ceinture de sécurité...

Toutefois, renseignez-vous auprès de l'équipe soignante si vous pratiquez une activité physique ou sportive intense (golf, tennis...). Par contre, la plongée sous-marine est contre indiquée en raison des problèmes de pression.

EN CAS DE QUESTIONS :

Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur votre PAC, l'équipe de l'hôpital de jours se tient à votre disposition. Elle vous dirigera, en fonction de votre problème, vers la personne compétente.

Centre hospitalier Glorieux, service clinique de jour, avenue glorieux 55, 9600 Renaix, tel : 055/23 33 05 ou le numéro central 055/23 30 11