



VARICES

CHIRURGIE GÉNÉRALE

Dr L. De Bock
Dr J. Tiek

SÉCRETARIAT

Tél. 055/23 35 95

INFIRMIÈRE EN CHEF

Ann Bauters
Tél. 055/23 33 36

absl Werken Glorieux | ch Glorieux
Avenue Glorieux 55, B-9600 Ronse
T 055 23 30 11, F 055 23 30 22
www.azglorieux.be, info@azglorieux.be

7/04/2017
CHI06_FR

DIRECTIVES EN CAS D'OPÉRATION DES VARICES

QUOI ?

La solution opératoire en cas de varices consiste en l'ablation (stripping) de l'entièreté des veines.

DIRECTIVES PRÉOPÉRATOIRES

Avant l'opération, le patient doit être à jeun. Cela signifie qu'il ne doit plus manger, boire ou fumer après minuit.

DIRECTIVES POSTOPÉRATOIRES

Dr. De Bock

Un bandage élastique est placé sur votre jambe étendue, afin de limiter au maximum d'éventuels hématomes. La jambe non opérée doit porter un bas de contention qui peut être retiré le jour suivant l'opération.

Le soir de l'intervention, vous pouvez prendre un repas facile à digérer. L'objectif est de pouvoir reprendre une vie active aussi vite que possible : alterner promenades régulières et périodes de repos avec la jambe surélevée.

Lors d'une prochaine consultation (après 5 jours), le bandage élastique sera retiré et vous devrez porter à cette jambe un bas de contention pour une période de 4 à 6 semaines.

Dr. Tiek

Un bandage élastique est placé sur votre jambe étendue, afin de limiter au maximum d'éventuels hématomes. Le jour de l'intervention dr. Tiek sera retiré le bandage élastique et vous devrez porter un bas de contention. La jambe non opérée doit porter un bas de contention qui peut être retiré le jour suivant l'opération.

Le soir de l'intervention, vous pouvez prendre un repas facile à digérer. L'objectif est de pouvoir reprendre une vie active aussi vite que possible : alterner promenades régulières et périodes de repos avec la jambe surélevée.

Vous recevrez une rendez-vous après 5 jours.



Dr. De Bock et Dr. Tiek

Les fils sont retirés lors de la prochaine consultation.

Après l'opération, la jambe présente un certain nombre de taches bleues. Il s'agit d'hématomes qui disparaîtront spontanément après quelques semaines.

Ne pas prendre de douche/bain pendant les 12 premiers jours. Une fois les plaies bien cicatrisées, il est à nouveau possible de prendre une douche/un bain.

Des antidouleurs ne doivent être pris qu'en cas de douleur. Le cas échéant, il est préférable d'utiliser un médicament comme le paracétamol et d'éviter l'aspirine car elle a une action fluidifiante sur le sang.

SIGNAUX D'ALARME

- Une plaie qui continue à saigner.
- Une douleur importante peut indiquer des troubles de l'irrigation sanguine.
- Une perte de sensibilité au niveau de la cheville.
- Fièvre.

EN CAS DE PROBLÈME CONTACTER :

Secrétariat Chirurgie
Tél. 055/23 35 95

RENDEZ-VOUS

Date:

Heure:

Service:

Si, en raison de circonstances imprévues, l'examen ne peut se dérouler, prière d'avertir le service le plus rapidement possible au numéro du Secrétariat Chirurgie: 055/23 33 36.