KU LEUVEN

CONTACT
Collaborative Network to take Responsibility for Oral Anti-Cancer Therapy

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde | UNIVERSITEIT GENT

DÉMARRAGE

Une thérapie orale est envisagée

- Réunion de concertation multidisciplinaire, mardi après-midi
- Planification d'une consultation chez l'oncologue (en l'oncocoach)

Présentation de la thérapie orale au patient – entretien « mauvaises nouvelles »

- Oncologue
- Oncocoach

Consultation « l'information peut-elle être partagée avec la famille et les amis du patient ? » via l'app/le site nexuzpro ou via le rapport de l'oncologue si pas de consentement du patient

Rapport numérique + lettre d'information + fiche de produit de la médication au généraliste

Schéma de médication (éventuels changements de la thérapie à domicile) à consulter de manière électronique ou chez le patient (dans le dossier d'information)

Préparation du démarrage – examen de la médication

- Pharmacien d'hôpital
- Oncocoach
- Oncologue

Les interactions majeures sont communiquées au généraliste via le rapport de l'oncologue

Explication sur le démarrage effectif de la thérapie orale + première rencontre avec l'équipe

- (Oncologue)
- Oncocoach
- Pharmacien d'hôpital
- Diététicien
- Service social
- Psychologue

Il est recommandé au patient de passer chez le généraliste 1,5 semaine plus tard

SUIVI

Premier suivi – par téléphone (dans les 7 jours)

Oncocoach

Rapport des éventuels effets secondaires au généraliste

Consultation chez le généraliste

- Médecin généraliste

- Examiner le schéma de médication et éventuellement l'adapter.
- Informer le patient sur les vaccins pendant/après le traitement (voir info oncologue)

Première consultation de suivi à l'hôpital

- Oncocoach
- Pharmacien d'hôpital
- Oncologue

Contacts téléphoniques de suivi (en cas de consultation tous les 3 mois)

- Oncocoach
- Psychologue

Consultation de suivi répétée à l'hôpital/première ligne

- Oncologue
- Oncocoach
- Pharmacien d'hôpital
- Pharmacien de référence
- Médecin généraliste

Consultation après 3 mois