

Als peritoneale dialysepatiënt is het belangrijk om het niercentrum vooraf op de hoogte te stellen wanneer je endoscopische of invasieve onderzoeken dient te ondergaan.

Waarom?

Deze onderzoeken kunnen namelijk het risico op een buikvliesontsteking (peritonitis) verhogen. Daarom raden we patiënten aan voorafgaand aan deze onderzoeken een eenmalige preventieve dosis antibiotica in te nemen enkel op voorschrijf van de arts.

Verder adviseren we voorafgaand aan het onderzoek het dialysaat uit je buik te laten lopen (zogenaamde 'lege buik').

Over welke onderzoeken gaat het?

- Coloscopie (onderzoek van de darmen)
- Hysteroscopie (onderzoek van de baarmoeder)
- Gastrografine lavement

Praktische informatie

- **Meld je afspraak voor een onderzoek tijdig:** Laat je behandelend nefroloog of PD-verpleegkundige weten wanneer je een afspraak hebt voor een van deze onderzoeken.
- **Leeg je buik:** Zorg ervoor dat je buik leeg is voordat je naar het ziekenhuis gaat.
- **Afspraak dagziekenhuis:** Als je een afspraak hebt in het dagziekenhuis, zorg dan dat je minstens twee uur voor het onderzoek aanwezig bent.
- **Antibiotica:** Meld aan het team indien je allergisch bent aan bepaalde geneesmiddelen. Er zal voorafgaand 1 of meerdere antibiotica worden gegeven om de kans op ontsteking van het buikvlies te verminderen.

LET OP!

Als je in de dagen na het onderzoek troebel of bloederig dialysaat, buikpijn en/of koorts ontwikkelt, neem dan onmiddellijk contact op met het niercentrum of de dienst spoedgevallen buiten de kantooruren van het dialysecentrum.

